アジア・アフリカの水・衛生と サニテーションの意義

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科
(兼 京都大学アフリカ地域研究資料センター)

原田英典

- 基本的な水源へアクセスできない：
18.4%@2000→8.5%(6.7億人)@2024
- 安全な水を家の至近で常時使えない：
38.7%@2000→26.3%(21.4億人)@2024

マラウイのムズズ市から車で30分ほどの農村にて

くらしとサニテーション（し尿の始末）

3/24

- 基本的なトイレを使えない：
44.1%@2000→18.0%(14.7億人)@2024
- し尿を安全に始末できない：
68.7%@2000→41.5%(33.9億人)@2024

し尿の不始末の影響

4/24

バングラデシュ・クルナにて

(IHME GBD 2021より作成)

サニテーションの問題系

図は以下を改変：Harada (2022)
Social allocation of the health
risks in sanitation, In: Yamauchi,
Nakao, Harada (eds) *The
Sanitation Triangle*, Springer.

□ 水・衛生はマルチバリア

□ サニテーションがきれいに行っているのは環境/場 -> 環境衛生

- 大規模疫学調査で有意な効果がしばしば見えない (例：Clasen et al. 2014)
- コミュニティーの7割程度以上へ導入で効果が顕在化 (Jung, Y. et al., 2017)

サニテーションの効果の不可視性・間接性・公共性と実感の乏しさ

水は循環する：水道の先行と下水

180万人が暮らすカンパラ

安全な水：78%

下水処理率：10%

下水処理水

BOD: 210 mg/L
E. coli: $10^{7.8}$ CFU/100mL
 CPFX/CTX/GM耐性: 67%

7/24

E. coli: 64.5 CFU/100mL
 CPFX/CTX/GM耐性: 47%

E. coli 10 CFU/100mL
 CPFX/CTX/GM耐性: 12%
 藻類の繁殖

ビクトリア湖

浄水場

水は流れる：都市下水の下流への影響

Nhue川中流

Nhue川下流

図. Nhuê川の流下に伴う水質の推移

河川水に接触している人の回虫感染率：

OR 2.1 [95% CI: 1.4–3.2] (Pham-Duc et al. 2013)

Harada (2022)

data originated from Sakaguchi (2016)

都市下水の増大 → 下流での水質悪化と生業（漁撈）の変化

どうすればうまくし尿の始末をつけ、
水を、くらしを、環境を守れるか？

水を使わず，し尿を使う

- 水を使わないし尿分離トイレ (UDDT)
 - 灰を用いた大便の衛生処理
 - 大便堆肥と尿液肥の利用
- トイレで衛生改善と食料安全保障
 - SSアフリカ3.0億人が深刻な食糧不安 (FAO, 2024)
- 2002年にベトナムでNGOと導入

図. 大便と小便の分離

表. し尿の成分

成分	尿	大便
N (g/L/日)	11.0	1.5
P (g/L/日)	1.0	0.5
K (g/L/日)	2.5	1.0
病原体	ほぼ含まず	大部分

(SEPA, 1995)

図. 灰による大便の不活化 (Harada et al., 2012)

肥料価値はサニテーション定着を後押しする？ ^{12/24}

マラウイ

人口: 2200万人 (2024)

1人当たりGNI: 1790 USD (2024)

衛生的なトイレ利用: 農村の49.5% (2022)

安全な水源利用: 農村の68.8% (2022)

(World Development Indicators DBより)

- ❑ (公社) 日本国際民間協力会が
2007-2014年に1052基のUDDTを導入
- ❑ 導入後5年以上経過した277基を調査

事業地	人口	導入数
TA Mwadzama, Nkhotakota Dist.	5,866	402
TA Malengachanzi, Nkhotakota Dist.	11,476	239
TA Kayembe, Dowa Dist.	4,000	242
TA Malili, Lilongwe Dist.	4,758	169

データ出典: NICCO本部

マラウイ・コタコタの農村

マラウイ・コタコタのUDDT

- 79.8%のトイレは5年以上後も利用
- 利用中トイレの98%で大便を利用
(主にメイズ)
- 大便の高い価値認識と動機づけ
 - c.f. 約6割は動物堆肥の利用経験

図. 大便の肥料価値認識

(Harada, 2022)

表. トイレを継続利用している主たる動機

UDDT利用動機	%
堆肥を得られる	93
ピットラトリンより長く使える	46
衛生的	26
場所の節約	24

- 尿は利用中トイレの36%で利用
- 尿の肥料価値の認識は低い
- 尿利用の継続利用に正の傾向
 - 肥料価値認識が高い ($p < 0.01$)
 - 水の安全性に楽観的 ($p < 0.01$)
 - 健康改善の期待が低い ($p < 0.01$)

-> 安全への懸念

肥料価値はサニテーション定着を
後押ししつつ、思惑にズレも

図. 尿の肥料価値認識

自分ごとにする

サハラ以南アフリカの未計画居住区

16/24

- ❑ ザンビア・首都ルサカでは人口の6~7割が同区に居住 (Wragg & Lim, 2015)
- ❑ 共同水栓での水汲みと断水・低水圧
- ❑ 広がるピットラトリンと不法投棄
- ❑ 数年おきのコレラのアウトブレイク
 - 2023/24の雨季には23,000人以上が感染, 700人以上が死亡

- 広く普及する「安全な水」
 - 市域の水供給率は93.7%。しかし間欠的。
 - 水栓では非汚染のことも多いが、50%で遊離Clは<0.2 mg/L (**脆弱**)
- 貯留水は取水・貯留過程で顕著に水質が劣化 (下図)

図. 水の貯留による水質変化

水を汚さない生活環境の構築が不可欠だが・・・

“NO sanitary toilet
BUT a mobile phone”

見えないから？

貯留水

コップ

ハエ

水たまり

	細菌	ウイルス	原虫
	<i>E. coli</i>	Rotavirus	<i>Cryptosporidium</i> spp.
貯留水	6/10	3/10	2/10
コップ	10/20	2/13	1/13
ハエ	35/55	5/17	1/17
水たまり	10/19	2/10	0/10

(+ sample / total sample)

「教える」のではなく、「実感」する

表 下痢に係る媒体の参加者の主観的な重要度ランキング

体験前		体験後	
1	飲用水	1	キッチン床
2	カバーしていない食事	2	トイレ床
3	洗っていない手	3	ゴミ捨て場
4	トイレ	4	玄関床
5	キッチン床	5	コップ表面
6	生活用水	6	手表面
7	ゴミ捨て場	7	トイレ水溜り

水や食べ物自体から、それを守る**環境衛生**への広がり

行政だけでなく，自分ごととする

生活周りの環境改善と行動変容が不可欠

下痢リスク可視化による参加型水・衛生改善

23/24

(FY2024.6-2029.6)

ザンビアでJST/JICA SATREPS (ODA)として実施中

上位目標

- アフリカ未計画居住区の水・衛生を改善して下痢を防ぐ

プロジェクト目標

- アプリを活用した参加型調査で下痢リスクを可視化し、水・衛生アクションプランの策定・実践を支援
- 参加型調査の低精度データを処理・DB化して統計創出

日本側：京都大，北大，東北大，関西医科大，南山大，立命館大
ザンビア側：ザンビア大，ルサカ市公衆衛生局，ルサカ水衛生公社

<https://wash.africa.kyoto-u.ac.jp/splash>

- 忘れられがちな静脈と地域の代謝
- 水と，それに付随する物質が健全に循環する仕組みをいかに築くか？
- アフリカと日本の問題系の相似
 - 農業，可視化，市民参加，災害

災害用に開発したUDDTs
(日本水大賞グランプリ)

Water
Env
Lab
Sanitation
Hygiene

@HHarada_KU

<https://wash.africa.kyoto-u.ac.jp>

ご清聴ありがとうございました

ルサカ・チャワマ地区でのワークショップ参加者と共に